

## Piezīmes un atsauces Natura 2000 teritorijas līmeņa aizsardzības mērķa (CO) noteikšanai: datu izvēle un eksperta pieņēmumi

|   |  |
|---|--|
| <b>Sugas kods:</b>                        | 1166   |
| <b>Suga:</b>                              | Triturus cristatus   |
| <b>Natura 2000 teritorijas kods:</b>      | LV0525000  |
| <b>Natura 2000 teritorijas nosaukums:</b> | Maņģenes meži  |
| <b>Eksperts(i):</b>                       | Andris Čeirāns   |
| <b>Darbs pabeigts:</b>                    | 31.07.2022.  |
| <b>Vispārējās piezīmes:</b>               | CO noteikšanā lielajam tritonam izmanto divas dažādas metodes: pirmā balstās sistemātisku (zinātnisku) izpēti (tritonu kāpuru uzskaites), bet otrā – uz gadījuma novērojumiem (lokalitāšu skaitu). Abos gadījumos uzskaišu vienības pārvērstas indivīdos, taču, ņemot vērā šo uzskaišu dažādos precizitātes līmeņus, katrai no šīm metodēm izmantotas atšķirīgas paraugkopas un definēti atšķirīgi optimālie blīvumi (OPT_DEN). Maņģenes mežiem nav uzskaišu datu, tādēļ izmantota otrā sistēma. |

### Piezīmes un pieņēmumi tabulu aizpildīšanā/izmantošanā

| Lauks                   | Paskaidrojums  |
|-------------------------|--|
| <b>CV_USE</b>           | Kolonnās “Popmin” un “Popmax” populācijas lielums 100-350 īpatņu (Čeirāns u.c. 2018) balstās uz pieņēmumu, ka šāds varētu būt tritonu skaits vienā-divās Maņģenes mežu atradnēs. DP datu bāzē OZOLS ir ziņas par 1 lokalitāti.<br>Latvijas ĪADT, kur ir veiktas tritonu kāpuru uzskaites, konstatētajiem kāpuru blīvumiem vidēji atbilda 31-659 pieauguši īpatņi vienā ūdenstilpē (ko var pieņemt par skaitu vienā lokalitātē); šajos datos mediāna bija 142.8 pieauguši īpatņi (mediāna, atšķirībā no vidējā aritmētiskā, ļauj atņemt ļoti zemu un ļoti augstu mērījumu, kas varētu būt radušies kļūdu dēļ). Tādējādi, izmantojot Latvijas populāciju datus, domājamais populācijas lielums Maņģenes mežu lokalitātē precizēts un kolonnā “CV_USE” sniegts īpatņu skaits – 143. |
| <b>Unit_CV</b>          | i-īpatņi; tikai pieaugušie, vairotiespējīgie īpatņi, jo skaits iegūts veicot kāpuru blīvuma datu transformācijas tām atbilstošā pieaugušu īpatņu skaitā.   |
| <b>Habitat</b>          | Cits: suga nav saistīta ar Direktīvas biotopiem, pamata vairošanās vietas ir nelielas stāvošas ūdenstilpes ar platību <0.5 ha. Sauszemes biotopi ir ļoti daudzveidīgi, suga nav saistīta ar specifiskiem sauszemes biotopiem.  |
| <b>Annex I</b>          | na   |
| <b>Annex I_area_USE</b> | na   |
| <b>Other_area_USE</b>   | 2201.512 ha ir kopējā ĪADT Maņģenes meži platība, jo nav konstatētas lielākas tritonam nepiemērotu biotopu platības. Reāli apdzīvoto biotopu platība nav nosakāma, ietver vairošanās ūdenstilpes un nezināmas platības sauszemes biotopus.   |
| <b>OK_DEN</b>           | Nē, esošais blīvums (0.065 īpatņi/ha) nav pietiekošs. Tas ir 5.8 reizes zemāks par optimālo (sk. OPT_DEN).   |

| Lauks                      | Paskaidrojums   |
|----------------------------|---|
| <b>OPT_DEN</b>             | Dotajā CO aprēķinā veikta lokalitāšu skaita transformēšana populācijas lielumā, izmantojot vienai lokalitātei atbilstošu lielā tritona pieaugušo īpatņu skaitu (sīkāk sk. CV_USE paskaidrojumā). Optimālā blīvuma noteikšanai sākumā aprēķināts lokalitāšu blīvums visām ĪADT (n=19), kurām zināmas konkrētas lielā tritona atradnes. Pieņemts, ka šīs paraugkopas labākajā trešdaļā blīvums ir optimāls, tādēļ tai aprēķināta 67% percentile, kas ir labākās trešdaļas apakšējā robeža, un tā pieņemta par optimālo blīvumu CO aprēķinā. Paraugkopā lokalitāšu blīvums variēja robežās no 0.000055 līdz 0.061246, bet 67%percentile bija 0.002648 lokalitātes/ha. Pieņemot, ka 1 lokalitātei atbilst 142.8 īpatņu liela populācija (sk. CV_USE), 67% percentilei (OPT_DEN) atbilst 0.378177 īpatņi/ha. |
| <b>OK_NEW</b>              | Nē. Kopējā biotopa platība nav jāpalielina, jāpaaugstina tās kvalitāte, izveidojot jaunus vairošanās biotopus un uzlabojot esošos (sk. Papildus nosacījumi).  |
| <b>AREA_NEW</b>            | na  |
| <b>IND_NEW</b>             | na  |
| <b>OK_INT</b>              | Nē.   |
| <b>IND_INT</b>             | na  |
| <b>Papildus nosacījumi</b> | Pieņemot, ka vidējais sub-populācijas lielums lokalitātē ir 143 pieauguši īpatņi, bet attālums līdz mērķim (CO) ir 690 īpatņi, mērķi varētu sasniegt izveidojot 5 jaunas populācijas (=lokalitātes). Jaunas lokalitātes var izveidot uzlabojot vai izveidojot ūdenstilpes – vairošanās biotopus, kur izveidotos jaunas tritonu populācijas.   |

### Izmantotā literatūra

Čeirāns A., Pupiņš M., Pupiņa A. 2018. Abinieku un rāpuļu fona monitorings un monitorings Natura 2000 teritorijās (2016.- 2018.gadam). Gala atskaite saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes iepirkuma līgumu Nr. 7.7/77/2016-P. 81 lpp.