

Piezīmes un atsaucis vietas līmeņa aizsardzības mērķa (CO) noteikšanai: datu izvēle un eksperta pieņēmumi

Sugas kods	1013
Sugas nosaukums	<i>Vertigo geyeri</i>
Natura 2000 teritorijas kods	LV0530600
Natura 2000 teritorija	Motrines ezers
Eksperte	Digna Pilāte
Darbs pabeigts	12.02.2023.
Vispārējās piezīmes	<p>Dabas liegumā “Motrines ezers” <i>Vertigo geyeri</i> pirmoreiz konstatēts 2015. gadā, veicot <i>Vertigo angustior</i> monitoringu (Pilāte, Jakubāne, 2015). Šajā teritorijā suga sastopama nelielā pārejas purvā ezera piekrastē (LKS-92: 719406, 308449).</p> <p>Sugas populācijas blīvums ir 12,5 ind./m². Izmantoti vienas transektes dati. Mitrāju suga. Apdzīvo kalcifilus zāļu purvus, pārejas purvus un mitras pļavas ar augstu, bet stabilu gruntsūdens līmeni. Novērtējot biotopa platības, kurās <i>V. geyeri</i> var būt sastopams, jāņem vērā sugas ekoloģiskās prasības (Cameron et al., 2003).</p>

Lauks	Paskaidrojums																																			
CV_USE	51250 indivīdi. Skaitlis aprēķināts no populācijas blīvuma vērtējuma (12,5 ind./m²), kas attiecināts uz kopējo sugai piemēroto biotopu platību šajā teritorijā.																																			
Unit_CV	Indivīds																																			
Habitat	Annex I_viens. Šajā dabas liegumā sugas dzīvotne ir saistīta ar Eiropas Savienības (ES) nozīmes biotopu 7140 <i>Pārejas purvi un slīkšņas</i> .																																			
Annex I	7140																																			
Annex I_area_USE	7140 – 0,83 ha saskaņā ar DDPS “Ozols” pieejamo ES nozīmes biotopu kartējumu (informācija skatīta 8.12.2022.). Ņemot vērā sugas sastopamību, sugai piemēroti ir 50 % no kopējās sugai atbilstošo biotopu platības – 0,41 ha. Sugas sastopamība transektē aprēķināta pēc formulas: F = 100 * b / a, kur a – paraugu kopskaits vienā transektē, b – paraugu skaits, kuros konstatēta suga. Vidējā platība aprēķināta, izmantojot vienas transektes datus. No pieejamajiem datiem var secināt, ka suga nav sastopama vienmērīgi, kam par iemeslu parasti ir biotopa nevienmērīgums un kādas tā daļas neatbilstība sugas ekoloģiskajām prasībām. Šī iemesla dēļ nevar uzskatīt, ka visa biotopa platība atbilst <i>V. geyeri</i> dzīvotnei.																																			
Other_area_USE	Na																																			
OK_DEN	Sugas populācijas blīvumi Latvijā (ind./m²) ir sekojoši: <table><tr><th>Teritorijas kods</th><th>Natura 2000 teritorijas nosaukums</th><th>Faktiski uzskaitītie indivīdi</th><th>CV_DEN</th><th>Blīvums</th></tr><tr><td>LV0531800</td><td>Pelcišu purvs</td><td>3</td><td>3</td><td>zems</td></tr><tr><td>LV0531400</td><td>Apšuciema zāļu purvs</td><td>90</td><td>3,3</td><td>zems</td></tr><tr><td>LV0200100</td><td>Gaujas Nacionālais parks</td><td>15</td><td>3,9</td><td>zems</td></tr><tr><td>LV0200300</td><td>Slīteres Nacionālais parks</td><td>24</td><td>5</td><td>zems</td></tr><tr><td>LV0302100</td><td>Abavas senleja</td><td>17</td><td>5</td><td>zems</td></tr><tr><td>LV0531700</td><td>Platenes purvs</td><td>42</td><td>5,1</td><td>zems</td></tr></table>	Teritorijas kods	Natura 2000 teritorijas nosaukums	Faktiski uzskaitītie indivīdi	CV_DEN	Blīvums	LV0531800	Pelcišu purvs	3	3	zems	LV0531400	Apšuciema zāļu purvs	90	3,3	zems	LV0200100	Gaujas Nacionālais parks	15	3,9	zems	LV0200300	Slīteres Nacionālais parks	24	5	zems	LV0302100	Abavas senleja	17	5	zems	LV0531700	Platenes purvs	42	5,1	zems
Teritorijas kods	Natura 2000 teritorijas nosaukums	Faktiski uzskaitītie indivīdi	CV_DEN	Blīvums																																
LV0531800	Pelcišu purvs	3	3	zems																																
LV0531400	Apšuciema zāļu purvs	90	3,3	zems																																
LV0200100	Gaujas Nacionālais parks	15	3,9	zems																																
LV0200300	Slīteres Nacionālais parks	24	5	zems																																
LV0302100	Abavas senleja	17	5	zems																																
LV0531700	Platenes purvs	42	5,1	zems																																

Lauks	Paskaidrojums				
	LV0521800	Ķirbas purvs	103	5,7	zems
	LV0302800	Engures ezers	86	9,7	zems
	LV0526700	Pelēču ezera purvs	12	11	optimāls
	LV0530600	Motrines ezers	15	12,5	augsts
	LV0200200	Ķemeru Nacionālais parks	145	15	augsts
	LV0530400	Ječu purvs	49	19,2	augsts
	LV0523400	Ances purvi un meži	18	30	augsts
	LV0300400	Silene	40	40	augsts
	LV0303000	Numernes valnis	53	44,2	augsts
	LV0507800	Liepājas ezers	81	55	augsts
	LV0831300	Bānūžu Zelta avots	65	65	augsts
	LV0302000	Talsu pauguraine	137	137	augsts
	Teritorijas, kurās nav iespējams novērtēt sugas blīvumu				
	LV0302200	Salacas ieleja	0	14,4	Balstoties uz pieejamajiem datiem, nav iespējams novērtēt; pieņemts vidējais valstī; optimāls; augsts
	LV0505400	Aizdumbles purvs	<10	14,4	Balstoties uz pieejamajiem datiem, nav iespējams novērtēt; pieņemts vidējais valstī; augsts
	LV0508000	Rucavas īvju audze	1	14,4	Balstoties uz pieejamajiem datiem, nav iespējams novērtēt; pieņemts vidējais valstī; augsts
	LV0521300	Dīļu pļavas	2	14,4	Balstoties uz pieejamajiem datiem, nav iespējams novērtēt; pieņemts vidējais valstī; augsts
	LV0524100	Mežole	<10	14,4	Balstoties uz pieejamajiem datiem, nav iespējams novērtēt; pieņemts vidējais valstī; augsts
	LV0528000	Rauza	0	14,4	Balstoties uz pieejamajiem datiem, nav iespējams novērtēt; pieņemts vidējais valstī; augsts
	LV0531900	Popes zāļu purvs	Nav datu	14,4	Balstoties uz pieejamajiem datiem, nav iespējams novērtēt; pieņemts vidējais valstī; augsts
	LV0600400	Augšdaugava	30	14,4	Balstoties uz pieejamajiem datiem, nav iespējams novērtēt; pieņemts vidējais valstī; augsts
	LV0600700	Ziemeļgauja	1	14,4	Balstoties uz pieejamajiem datiem, nav iespējams novērtēt;

Lauks	Paskaidrojums				
					pieņemts vidējais valstī; augsts
	LV0305000	Zvārdes meži	Nav datu	14,4	Balstoties uz pieejamajiem datiem, nav iespējams novērtēt; pieņemts vidējais valstī; augsts
	Teritorijas ar kļūdainu ierakstu; nav pierādījumu par sugas populāciju				
	LV0525600	Zvārde	0	Na	
	LV0530000	Skujaines un Svētaines ieleja	0	Na	
	LV0531100	Baltezera purvs	0	Na	
	LV0536600	Lubāna mitrājs	0	Na	
	Optimālais populācijas blīvums ir eksperta viedoklis, kas izriet no pieejamajiem datiem, sugas sastopamības un ekoloģijas.				
OPT_DEN	<p>Par optimālo populācijas blīvumu pieņemti 11 ind./m², kas ir tuvu vidējam blīvumam valstī. Šis blīvums CO tabulā arī izmantots aizsardzības mērķa (CO) aprēķināšanai. Saskaņā ar pētījumu un monitoringa datiem, Latvijā vidējais sugas blīvums ir 14,4 ind./m² (min 0,7 max 135), kas vērtējams kā augsts, ņemot vērā, ka vairumā gadījumu konstatētais gliemežu blīvums vai daudzums paraugos reti pārsniedz 10 indivīdus. Dati iegūti dažādās vietās Latvijā no 53 transektēm.</p> <p>Indivīdu skaitu populācijā var būtiski ietekmēt klimatiskie apstākļi (piemēram, sniega segas biezums ziemā, ilgstošs sausums un karstums vai ilgstošas lietusgāzes). Labvēlīgos klimatiskajos apstākļos populācija sasniedz maksimumu, gliemežiem savairojoties. Hermafrodīts, iespējama pašapaugļošanās. Vairošanās notiek optimālos mitruma apstākļos. Sezonā izdēj 1 līdz 10 olas. Visvairāk juvenīlu īpatņu populācijā ir septembrī, oktobrī. Dzīves ilgums ir vairāk nekā gads, bet nesasniedz divus gadus (Cameron et al., 2003; Moorkens, Killeen, 2011).</p> <p>Populācijas blīvums atkarīgs arī no dzīvotnes stāvokļa, piemēram, hidroloģiskā režīma stabilitātes, augu sastāva, aizauguma vai apsaimniekošanas intensitātes. Bieži suga biotopā var būt sastopama izkliedēti, mozaīkveidīgi nelielās platībās. Blīvums var būt no dažiem līdz pāris simtiem indivīdus uz 1 m² (Cameron et al., 2003). Lietuvā sugas blīvums ir 4–5 ind./m² (Skujienē, 2021).</p>				
OK_NEW	Na				
AREA_NEW	Na				
IND_INT	Na				
Papildus nosacījumi					
Cits lauks					

Literatūra un informācijas avoti

Cameron R. A. D., Colville B., Falkner G., Holyoak G. A., Hornung E., Killeen I. J., Moorkens E. A., Pokryszko B. M., Proschwitz T. von, Tattersfield P., Valovirta I. 2003. Species accounts for snails of the genus *Vertigo* listed in Annex II of the Habitats Directive. In: Speight M. C. D., Moorkens E. A., Falkner G. (eds.) Proceedings of the Workshop on Conservation Biology of European *Vertigo* Species. Heldia 5 (7): 151–170.

Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu pārvaldības sistēma “Ozols”, <https://ozols.gov.lv/ozols/> (skatīts 8.12.2022.).

Moorkens E. A., Killeen I. J. 2011. Monitoring and Condition Assessment of Populations of *Vertigo geyeri*, *Vertigo angustior* and *Vertigo moulinsiana* in Ireland. Irish Wildlife Manuals, No. 55. National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and Gaeltacht, Dublin, Ireland.

Pilāte D., Jakubāne I. 2015. *Vertigo angustior*, Motrines purvs (monitoringa anketa 1) (nepublicēts).

Skujienė G. 2021. Keturdantė suktenė *Vertigo geyeri* Lindholm, 1925. In: Rašomavičius V. (red). Red Data Book of Lithuania. Animals, plants, fungi. Vilnius, pp. 76.